

TABELLE 2

Vesenertrag (= Kornertrag mit Spelz) und agronomische Eigenschaften von Dinkelsorten im Ökolandbau

	Zulassungs- jahr	Vesenertrag (relativ)									Pflanzenlänge	Standfestigkeit
		2018	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2019 bis 2020	2018 bis 2020		
		Anzahl der Versuche	3	3	4	Dorn- burg	Mittel- sömmern	Nossen	Görs- dorf	7		
Franckenkorn (BB)	1995	101	99	95	95	93	93	102	97	98	m-l	0/+
Zollernspelz (BB)	2006	104	100	103	101	111	106	94	102	102	k-m	++
Comburger (BB)	2016	93	98	97	101	89	97	99	98	96	l	+
Hohenloher (BB)	2016	100	102	99	101	92	97	106	100	100	m	++
Badensonne (BB)	2016	102	102	105	102	108	109	101	104	103	m-l	+
Zollernperle (BB)	2018	101	99	101	100	106	99	98	100	100	m	+
Gletscher*	2018		103	100	91	104	102	105	101		(m)	(+)
Copper*	2018		93	97	94	98	96	101	95		(m-l)	(++)
Woldemar SZS	2018		89	98	100	102	95	96	94		(m-l)	(+)
Serpentin*	2018			91	88	79	88	113			(l)	(-/0)
BB (dt/ha) abs. Vesenertrag		63,0	64,1	50,1	62,7	41,4	57,9	38,4	56,1	58,2		

sk = sehr kurz; k = kurz; m = mittel; l = lang; sl = sehr lang; BB = Bezugsbasis (Mittel der dreijährig geprüften Sorten); () vorläufige Einstufung; *Schweizer Sortenliste