

TABELLE 1

Anbauggebiete Winterdurum einschließlich Prüforte und Bundesländer nach Jahren

Südwest (Mittel- und Wärmelagen SW, Fränkische Platte)		Anbauggebiete Durum							
		2019	2020	2021	Ost (Löss-Standorte Mittel- und Ostdeutschland)	2019	2020	2021	
Giebelstadt	BY	x	x	x	Magdeburg	ST	x	x	x
Boxberg	BW	x	x	x	Bernburg	ST	x	x	x
Groß-Gerau	HE	x	x	x	Walbeck	ST	x	x	x
Haßloch	RP	x	x	x	Friemar	TH	x	x	x
Herxheim	RP	x		x	Dachwig	TH	x	x	x
Ober-Flörsheim	RP		x	x					

TABELLE 2

Relative Erträge der Landessortenversuche bei Winterhartweizen von 2019 bis 2021; Anbaugbiet Südwest

Sorte	Stufe 1: ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz				
	2019 N=5	2020 N=5	2021 N=6	2020–2021 N=11	2019–2021 N=16
Wintergold (B)	91	101	97	99	96
Diadur (B)	102	98	101	100	100
Sambadur (B)	101	100	103	102	102
Limbodur (B)	106	101	99	100	102
Saaledur	96	96			
Bezugsbasis (B) in dt/ha	71,2	69,7	61,8	65,47	67,2
Sorte	Stufe 2: mit ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz				
	2019 N=5	2020 N=5	2021 N=6	2020–2021 N=11	2019–2021 N=16
Wintergold (B)	94	102	96	99	97
Diadur (B)	101	96	102	99	100
Sambadur (B)	101	103	103	103	102
Limbodur (B)	104	100	99	99	101
Saaledur	95	96			
Bezugsbasis (B) in dt/ha	76,8	73,8	67,2	70,2	72,2

TABELLE 3

Relative Erträge der Landessortenversuche bei Winterhartweizen von 2019 bis 2021; Anbaugbiet Ost

Sorte	Stufe 1: ohne Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz				
	2019 N=5	2020 N=4	2021 N=5	2020–2021 N=9	2019–2021 N=14
Wintergold (B)	90	96	96	96	94
Diadur (B)	103	97	100	99	100
Sambadur (B)	105	103	100	101	103
Limbodur (B)	103	104	103	103	103
Saaledur	88	89			
Bezugsbasis (B) in dt/ha	60,3	65,7	65,5	65,6	63,7
Sorte	Stufe 2: mit ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz				
	2019 N=5	2020 N=4	2021 N=5	2020–2021 N=9	2019–2021 N=14
Wintergold (B)	88	97	94	96	93
Diadur (B)	101	95	102	99	100
Sambadur (B)	106	103	104	103	104
Limbodur (B)	105	105	100	102	103
Saaledur	87	86			
Bezugsbasis (B) in dt/ha	61,4	73,7	74,7	74,1	69,6